

PROTOCOLE SOINS DU NOMBRIL

Désinfection du cordon par trempage


1

Préparer la solution de trempage dans un contenant propre. Notre conseil : teinture d'iode à 5 % (1 volume de solution de povidone iodée à 10 % pour 1 volume d'eau)



2

Verser quelques mL de solution dans un récipient propre. Notre conseil : utiliser un **pot de trempage de trayon** afin de ne pas devoir renouveler le désinfectant entre chaque veau



3

Porter des gants propres.



4

Vider le cordon du veau de son contenu sanguin : Par pression entre l'index et le pouce depuis la base de l'ombilic jusqu'à l'extrémité du cordon, sans forcer.

5

Tremper le cordon dans la solution Veiller à ne pas mettre trop de solution sur la peau du ventre autour de l'ombilic.

6

Vider et nettoyer le récipient utilisé afin qu'il soit propre pour une prochaine utilisation. Si vous utilisez un pot de trempage pour trayon : nettoyer simplement la partie supérieure du pot à l'eau.

Critères d'alerte :



- Gros nombril : différencier une hernie ou une omphalite, Cf Protocole gros nombril
- Veau qui urine par le nombril : appeler vétérinaire
- Cordon trop long : ligaturer avec une ficelle fine trempée au préalable dans une solution désinfectante

